

PIDOCCHI

PREVENZIONE E TRATTAMENTO

CONTAGIO



- Attraverso il contatto diretto testa-testa (giocando, facendo sport, ecc...)
- Attraverso l'abbigliamento l'uso comune di spazzole per capelli, la biancheria da letto, imbottiture di testiere, sedie divani...

SINTOMI



- Prurito del cuoio capelluto
- Dermatiti e lesioni da grattamento

PREVENZIONE



- Evitare l'uso comune di pettini, spazzole per capelli, berretti, sciarpe, scialli, ecc.
- Mantenere un'accurata e regolare cura dei capelli, legare i capelli lunghi per ridurre il contatto da testa a testa.
- Controllare il capo una volta a settimana, soprattutto nelle zone prossime alla nuca, tempie e orecchie con molta attenzione, aiutandosi con l'apposita pettinina.



Non ci sono trattamenti preventivi di provata efficacia!

TRATTAMENTO



- AVVISARE LA SCUOLA
- ESEGUIRE IL TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO (prodotto specifico da acquistare in farmacia).
- ELIMINARE TUTTE LE LENDINI PRESENTI utilizzando l'apposito pettinino per lendini. Il lavaggio con una miscela calda costituita da acqua e aceto al 50% facilita lo sfilamento,
- EFFETTUARE UN CAMBIO COMPLETO DEGLI ABITI dopo il trattamento antiparassitario.
- CONTROLLARE I FAMILIARI CONVIVENTI.
- IGIENIZZARE pettini, spazzole per capelli, ecc. immergendoli per almeno 10 minuti in acqua molto calda 65° 54°. Lavare indumenti, biancheria da letto, peluche almeno a 65° 60°C in lavatrice o a secco. Le imbottiture dei mobili vanno lavate a secco, oppure pulite con l'aspirapolvere o con vapore. Oggetti di materiale non lavabile dovranno essere lasciati chiusi per 10 giorni in un sacco di plastica.
- RIPETERE TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO dopo 8 giorni.



Non serve tagliare i capelli corti!



Prendere i pidocchi non significa essere poco puliti!



I pidocchi non volano e non saltano da una testa all'altra!

Il bambino può tornare a scuola il giorno successivo l'avvenuto trattamento. È richiesta un'autocertificazione di avvenuto trattamento o, in alternativa, un certificato medico.

